



Hazte la prueba del VIH

VIH y SIDA no son lo mismo

Infección por el virus de Inmunodeficiencia humana VIH
(Hito Men-eki Fuzen Virus)




<p>Infección aguda o Infección primaria (Generalmente ocurren después de 2 a 8 semanas) (Kyuusei Shoujou)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Después de la infección se presenta síntomas similares a la gripe o resfriado
---	---



<p>Infección asintomática o Periodo de latencia clínica o de Portador asintomático (Mushoukousei Carrier) (Periodo variable entre 7 a 10 años)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aunque es portador del VIH, no significa que tenga SIDA Muchas personas no presentan síntomas y continúan en buen estado El virus debilita el sistema inmunológico lentamente A pesar que la persona no presente síntomas el riesgo de transmisión es alto El tratamiento en etapa temprana retrasa el inicio de la enfermedad
--	--

Al avanzar...



<p>Se presentan síntomas del SIDA (AIDS Hatsubyou)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Debilidad del sistema inmunológico Puede sufrir diversas enfermedades causadas por parásitos, hongos, bacterias o virus que generalmente no provocan ningún problema en personas sanas
--	---

La detección y el tratamiento temprano es importante

Principal vía de infección del VIH

- Infección por transmisión sexual
- Infección por contacto sanguíneo
(Compartir agujas, jeringas para el uso de drogas)
- Una madre infectada con VIH puede transmitir el virus al bebe (Transmisión madre a hijo)

Según el reporte en Japón informa que las personas infectadas y pacientes con SIDA principalmente está entre la edad de 20 a 30 años.





La prueba en el Centro Público de Salud es gratuita y puede hacerse de forma anónima

La infección por VIH se puede saber mediante un examen sencillo, tomando una pequeña cantidad de sangre (5ml. aprox.).

Sin embargo, si la transmisión ha ocurrido recientemente hay posibilidad que el resultado del examen salga negativo debido a que se tarda entre 6 a 8 semanas para desarrollar anticuerpos tras la infección. Por eso se recomienda realizarse el examen de anticuerpos del VIH después de 3 meses a más.

Fecha para realizar la prueba del SIDA (VIH) año 2022

Mes	Día				
Abril	6	13	20	27	
Mayo		11	18	25	
Junio	1	8	15	22	29
Julio	6	13	20	27	
Agosto	3	10	17	24	31
Setiembre	7	14	21	28	

Mes	Día				
Octubre	5	12	19	26	
Noviembre	2	9	16		30
Diciembre	7	14	21	28	
Enero	4	11	18	25	
Febrero	1	8	15	22	
Marzo	1	8	15	22	29

Desde el día 1 al día 7 de Junio es la "Semana de divulgación para la prueba del VIH"
1 de Diciembre "Día Mundial de la Lucha contra el SIDA"

■ **Fecha:** Todos los Miércoles de 13:00 a 15:00 hrs

El 4º Miércoles de todos los meses, el día 1 de Junio, el día 7 de Diciembre, los días con círculo en los horarios de (13:00 a 15:00, 17:30 a 19:00).

※ Excepto los días de fiesta de fin y comienzo de año y feriados

■ **Lugar a realizarse el examen:** Centro de Salud Pública de Yokkaichi (Yokkaichi-shi Hoken-jo). 5º piso del Centro Cívico (Sougou Kaikan). Yokkaichi-shi Suwa chou 2-2.

■ **Gratuito, confidencial y sin necesidad de hacer reserva**

■ Para informaciones sobre el resultado, será necesario venir nuevamente

【Contactos】

Centro de Salud Pública de la ciudad de Yokkaichi (Yokkaichi-shi Hoken-jo)
 Departamento de Prevención Sanitaria (Hoken Yobou-ka)
 Sección de Prevención Sanitaria (Hoken Yobou-gakari)

Teléfono : (059)352-0595 FAX : (059)351-3304

